



10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

10  
10  
10  
10

Cr (mg/l)

0.026

4.875

0.005

0.010

0.049

0.043

液  
甲  
振  
粗  
静定  
精

0.010

0.013

0.012

0.009

0.010

(mg/l)

表 2

	0.010		
	5.080		
	0.042		
	0.054		
	0.041		
	0.010		
	0.246		
	0.011		
	0.008		
粗 占	0.004		
石 灰			
水 泥 粉 土		10.8	25.2
		5.0	5.0
水 泥 粉 土			

水(隔)

注: 1. 试验温度为 20±5℃ (百分) 以内





H<sub>2</sub>  
100%CO<sub>2</sub>

2) 水銀のよごれと水素発生

表9

11.  
%

0.

LQ?

1.00

20

0.12

0.15

0.15

2.2

0.032

0.032 0.01

49

0

0

0

0

0

0

0

0

Cell No.

Outlet)

mg/l

0.66

0.34

0.80

3.3

0.000

入口  
0.00

出口

0.26

0

54.7

21.05

19

1.00

1.80

mg/ mg

同上

10

7

同上

1.44

66

43

10

15

34

28

90

136

11

8

0.003

114

62

0