

PRELIMINARY REPORT

[REDACTED]

高橋 治

[REDACTED]

沈 明

[REDACTED]

[REDACTED]



附目、(主)八部片目法

[REDACTED]

未 利

[REDACTED]


D... (T... (S... (D... (C... (D... (L... (A... (L...)



純粋な硫酸ナトリウム溶液の折光率

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 40\text{g}/\ell \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 80\text{g}/\ell$


1.00



0.

Abundance  
0.100

$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 40\text{g}/\ell - 20\text{ml}$



0.200

Abundance

0.100

不純物 溶出液 120~1 220

する、これより 20ml を取り出し、100% 抽出液とする。

同一条件で分析した結果、0.010

10.0

38.5

3

6.001

0.010

0.010

0.011

MSF

6


000

6.2

0.010

sorbance

| No. I | No. II | No. III | No. IV |
|-------|--------|---------|--------|
| 0.004 |        |         |        |



T. H. ...  
 ...  
 ...  
 ...

|       |       |
|-------|-------|
|       | 0.121 |
| 0.004 | 0.121 |
| 0.005 | 0.121 |

