

名 田 香 雄\*

入 海 鉄 男\*  
077\*

追加列八托



中野 隆夫 著 洋車達の発生と進歩 1970年 第14卷 第2号





Table 2 Rf Values of Additives

| Additives      | Solvent |      |      |      |      |
|----------------|---------|------|------|------|------|
|                | A       | B    | C    | D    | E    |
| 1. Inert       | 0.78    | 0.89 | 0.77 | 0.87 | 0.77 |
| 2. Santonox    | 0.10    | 0.50 | 0.08 | 0.25 | 0.38 |
| 3. Antioxidant | 0.22    | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| 4. Inert       | 0.49    | 0.95 | 0.09 | 0.41 | 0.66 |

1. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。



2. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。

3. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。

4. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。

5. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。

6. 花冠裂片长圆形，先端钝，基部楔形，长 4-5 毫米，宽 2-3 毫米，外被短柔毛，内面基部有腺体。花丝长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。花药长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。心皮长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。子房长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。果实长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。种子长 2-3 毫米，基部楔形，外被短柔毛。

A: CHCl<sub>3</sub> : C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> (1 : 1)

B: CHCl<sub>3</sub> : EtOH (97 : 3)

Fig. 6 Thin Layer Chromatogram of known

Column temp. 70°C

EVA-1

1 : EVA-1

2 : Observed

R<sub>f</sub>=0.02

R<sub>f</sub>=0.6

R<sub>f</sub>=0.1

time (min)

100

4. ま と め

